



דו"ח ניטור ארצי

כרמי יין 10/07/22 – 14

כשותית- נגיעות בעלים

● גליל עליון

84 חלקות, 1431 דונם
שלב פנולוגי : אשכול צפוף – 20% בוחל.
לא נמצאה נגיעות.

● מזרח השרון


37 חלקות, 877 דונם
שלב פנולוגי:– אשכול צפוף – 30% בוחל.
ב 21% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה
ב 8% מהחלקות נמצא נגיעות בינונית
ב 33% מהחלקות נמצא נגיעות גבוהה

● שפלת יהודה

132 חלקות, 6225 דונם
שלב פנולוגי: אשכול צפוף – 20% בוחל.
לא נמצאה נגיעות.

● חבל יתיר

47 חלקות, 444 דונם
שלב פנולוגי : אשכול צפוף – 50% בוחל.
לא נמצאה נגיעות.




● רמת גולן

100 חלקות, 1565 דונם
שלב פנולוגי :
הצטופפות – אשכול צפוף – 50% בוחל.
לא נמצאה נגיעות.

● הרי יהודה

61 חלקות, 1288 דונם
שלב פנולוגי : אשכול צפוף – 30% בוחל.
לא נמצאה נגיעות.

כנימה קמחית- שכיחות



ציקדה- שכיחות



עש האשכול- ניטור ביצים וזחלים.

● גליל עליון

כל החלקות מבולבלות (86 חלקות)
ב 9% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.8 ביצים לחלקה.
ב 16% מהחלקות נמצאו זחלים, 2.4 זחלים לחלקה.

● מזרח השרון

כל החלקות מבולבלות (25 חלקות)
ב 47% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.2 ביצים לחלקה.
ב 11% מהחלקות נמצאו זחלים, 2.0 זחלים לחלקה.

● שפלת יהודה

חלקות מבולבלות (78 חלקות)
ב 53% מהחלקות נמצאו ביצים, 3.5 ביצים לחלקה.
ב 11% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.3 זחלים לחלקה.
חלקות לא מבולבלות (44 חלקות)
ב 39% מהחלקות נמצאו ביצים, 3.2 ביצים לחלקה.
ב 3% מהחלקות נמצאו זחלים, 2.0 זחלים לחלקה.

● חבל יתיר


הכל לא מבולבל (47 חלקות)
ב 43% מהחלקות נמצאו ביצים, 4.9 ביצים לחלקה.
ב 17% מהחלקות נמצאו זחלים, 3.2 זחלים לחלקה.

● רמת גולן



חלקות מבולבלות (44 חלקות)
ב 27% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.8 ביצים לחלקה.
ב 20% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.9 ביצים לחלקה.
חלקות לא מבולבלות (50 חלקות)
ב 8% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.7 ביצים לחלקה.
ב 26% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.1 ביצים לחלקה.

● הרי יהודה


כל החלקות לא מבולבלות (61 חלקות)
ב 30% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.0 ביצים לחלקה.
ב 3% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.0 זחלים לחלקה.



עש האשכול- ניטור ביצים וזחלים.



עש האשכול- לכידת בוגרים במלכודות.



סיכום שבועי- כשותית

- נמשכת הנגיעות באזור מזרח השרון ב-60% מהכרמים
- לעומת אזור זה, אין דיווחים כלל מאזורים אחרים השנה. תופעה חריגה יחסית לשנים קודמות בהן הייתה כשותית רבה בתקופה זו.

סיכום שבועי- כנימה קמחית

- בתקופה זו ישנה בדרך כלל תנועה של הכנימה מהגזע ומעלה, בכיוון הבד והפרי. התנועה נעשית או על ידי הזחלנים או בעזרת נמלים שמעלות את הכנימות.
- אנו רואים כי אכן בשטח נראות יותר כנימות קמחיות בחלקים העליונים של הגפן.

סיכום שבועי- ציקדה

- ישנה פחיתה מסויימת בדיווחי ממצאי הציקדות בשבוע האחרון
- הירידה בדיווחים יכולה להיות תוצאה של מספר גורמים: (1) ריסוסי העש אפקטיבים בחלקם גם כנגד ציקדות, (2) יש מעט מאוד צימוח צעיר בתקופה זו, דבר שמביא למעבר של הציקדות לגידולים אחרים
- יחד עם ירידה מבורכת זו, ישנן חלקות וזנים שסובלים יותר מהציקדות, ובהן יש עליה/אין שיפור לאחר טיפול.
- כאמור, בכרמים שסובלים מנזקי ציקדות של הילה צהובה ועצירת צימוח, רצוי להמשיך ולטפל לשלב תכשירים מתאימים (התייעצו עם הפקח) יחד עם ריסוסי עש האשכול

סיכום שבועי- עש האשכול

- **עש האשכול מצוי כרגע בתקופה הכי משמעותית שלו בעונה - הדור השלישי.**
פוטנציאל הנזק גדול מאוד בזמן זה, בו הפרי מצוי בשלבי בוחל.
- **ממצאי הביצים השנה גדולים באופן משמעותי משנים קודמות**
- **מלכודות:** גם בתחילת הדור השלישי- מי שהסתמך על לכידות בוגרים במלכודות יכול היה לפספס את מועד תחילת הטלות הביצים בכרם (שקופית 7).
- **מי שהמתין לריסוס עד לעליה בלכידות בוגרים, למעשה פספס את הבקיעות הראשונות של הזחלים, שבוקעים בתקופה זו תוך כ-3 ימים מיום ההטלה**

סיכום שבועי- כללי

- הבציר מתקרב בחלקות המקדימות (זנים לבנים בעיקר), חשוב להקפיד ולבדוק את מספר ימי ההמתנה לבציר המופיעים בתווית התכשירים השונים. למשל תכשירי סייפרמטרין מורשים בשימוש עד 21 יום מבציר.