



דו"ח ניטור ארצי

כרמי יין 03/07/22 – 07

קימחון- שכיחות נגיעות באשכולות

● גליל עליון

84 חלקות, 1431 דונם
שלב פנולוגי : אשכול צפוף – תחילת בוחל.
0.5% נגיעות באשכולות.

● מזרח השרון

37 חלקות, 877 דונם
שלב פנולוגי: – תחילת בוחל – 20% בוחל.
0.5% נגיעות באשכולות.

● שפלת יהודה

132 חלקות, 6225 דונם
שלב פנולוגי: תחילת בוחל – 20% בוחל.
2.8% נגיעות באשכולות.

● חבל יתיר


47 חלקות, 444 דונם
שלב פנולוגי : תחילת בוחל – 20% בוחל.
0.2% נגיעות באשכולות.

● רמת גולן


100 חלקות, 1565 דונם
שלב פנולוגי :
הצטופפות – אשכול צפוף – תחילת בוחל.
0.1% נגיעות באשכולות.

● הרי יהודה


61 חלקות, 1288 דונם
שלב פנולוגי : אשכול צפוף – תחילת בוחל.
9.6% נגיעות באשכולות



כשותית- נגיעות בעלים



כנימה קמחית- שכיחות



ציקדה- שכיחות



עש האשכול- ניטור ביצים וזחלים.

● גליל עליון

כל החלקות מבולבלות (86 חלקות)
ב 5% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.0 ביצים לחלקה.
ב 15% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.8 זחלים לחלקה.

● מזרח השרון

כל החלקות מבולבלות (25 חלקות)
ב 45% מהחלקות נמצאו ביצים, 4.5 ביצים לחלקה.
ב 11% מהחלקות נמצאו זחלים, 2.0 זחלים לחלקה.

● שפלת יהודה

חלקות מבולבלות (78 חלקות)
ב 47% מהחלקות נמצאו ביצים, 4.9 ביצים לחלקה.
ב 5% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.7 זחלים לחלקה.

חלקות לא מבולבלות (44 חלקות)
ב 33% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.1 ביצים לחלקה.
ב 3% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.0 זחלים לחלקה.

● חבל יתיר

הכל לא מבולבל (47 חלקות)
ב 4% מהחלקות נמצאו ביצים, 1 ביצים לחלקה.
ב 47% מהחלקות נמצאו זחלים, 2.7 זחלים לחלקה.


● רמת גולן

חלקות מבולבלות (44 חלקות)
לא נמצאו ביצים
לא נמצאו זחלים



חלקות לא מבולבלות (50 חלקות)
ב 3% מהחלקות נמצאו ביצים, -0.2 ביצים לחלקה.
ב 18% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.6 ביצים לחלקה.

● הרי יהודה


כל החלקות לא מבולבלות (61 חלקות)
לא נמצאו ביצים
ב 33% מהחלקות נמצאו זחלים, 2.1 זחלים לחלקה.



עש האשכול- ניטור ביצים וזחלים.



עש האשכול- לכידת בוגרים במלכודות.



סיכום שבועי- עש האשכול

- השבוע החל הדור השלישי של עש האשכול. דווחה עליה משמעותית בממצאי ביצים באזור השפלה ומזרח השרון- נמצאו מספר ביצים רב, דבר שיכול להעיד על אוכלוסיה גבוהה יותר, או על משך דור מצומצם ו"מרוכז" יותר השנה.
- ב-3 השבועות האחרונים נמצאו זחלים רבים בכרמים (דור שני). על כן הסבירות היא שישנה רמת אוכלוסיה גבוהה השנה.
- לא דווחו ממצאים של ביצים באזורים הגבוהים והקרים. בדרך כלל מופיעות ביצים בהפרש של 7-10 ימים מתחילת הממצאים באזורים החמים יותר (תלוי טמפרטורה).
- נזכיר כי הריסוס מתבצע באופן המיטבי ביותר כאשר האשכולות מאוררים דיים, בעיקר על ידי חילון של עלים תחתונים.