



דו"ח ניטור ארצי

כרמי יין 11/08 – 31/07/22

כשותית- נגיעות בעלים

● גליל עליון

84 חלקות, 1431 דונם
שלב פנולוגי : בוחל מלא.

ב 36% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

● מזרח השרון

37 חלקות, 877 דונם
שלב פנולוגי: 90% בוחל – הבשלה.

ב 19% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

ב 46% מהחלקות נמצא נגיעות בינונית

● שפלת יהודה

132 חלקות, 6225 דונם
שלב פנולוגי: בוחל מלא – תחילת בציר.

ב 10% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

ב 4% מהחלקות נמצא נגיעות בינונית

● חבל יתיר

47 חלקות, 444 דונם
שלב פנולוגי : תחילת בציר.

ב 4% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

● רמת גולן

100 חלקות, 1565 דונם
שלב פנולוגי :

תחילת 80% בוחל – תחילת בציר.


ב 5% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

● הרי יהודה


61 חלקות, 1288 דונם
שלב פנולוגי : 90% בוחל – תחילת בציר.

ב 53% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

ב 4% מהחלקות נמצא נגיעות בינונית



כנימה קמחית- שכיחות



עש האשכול- ניטור ביצים וזחלים.

● גליל עליון

כל החלקות מבולבלות (86 חלקות)

לא נמצאו ביצים

ב 2% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.0 זחלים לחלקה.

● מזרח השרון

כל החלקות מבולבלות (25 חלקות)

לא נמצאו ביצים

ב 16% מהחלקות נמצאו זחלים, 3.0 זחלים לחלקה.

● שפלת יהודה

חלקות מבולבלות (78 חלקות)

ב 9% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.0 ביצים לחלקה.

ב 4% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.0 זחלים לחלקה.

חלקות לא מבולבלות (44 חלקות)

ב 13% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.7 ביצים לחלקה.

ב 1% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.0 זחלים לחלקה.

● חבל יתיר

הכל לא מבולבל (47 חלקות)

לא נמצאו ביצים וזחלים

● רמת גולן

חלקות מבולבלות (44 חלקות)

ב 5% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.0 ביצים לחלקה.

ב 5% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.5 זחלים לחלקה.

חלקות לא מבולבלות (50 חלקות)

ב 9% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.5 ביצים לחלקה.

לא נמצאו זחלים


● הרי יהודה

כל החלקות לא מבולבלות


(61 חלקות)

ב 11% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.0 ביצים לחלקה.


ב 2% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.0 זחלים לחלקה.




עש האשכול- לכידת בוגרים במלכודות.



עש האשכול- לכידת בוגרים במלכודות אל מול ניטור ביצים בשפלת יהודה בחלקות לא מבולבלות.



רקבונות - שכיחות



התקדמות בציר – אחוז חלקות בצורות



סיכום שבועי- עש האשכול

- ישנם דיווחים בחלק קטן מאוד של החלקות, על ממצאי ביצים בכמויות קטנות, לצד דיווחים על ממצאי זחלים בינוניים-גדולים (זחלי דור 3).
- לא ברור אם החלו הטלות של דור רביעי או שזהו המשך של הדור השלישי, שהיה השנה גדול יותר וגם ארוך יותר מהרגיל.
- לא קיימים פתרונות טובים לזחלים גדולים שמצויים בתוך הגרגרים, כך שטיפול בחומרים המקובלים לעש בשלב זה, הוא ביעילות נמוכה מאוד.
- קיימת עליה של לכידות בוגרים באזורים לא מבולבלים בשפלה.

סיכום שבועי- רקבונות

- ישנה עליה בשכיחות החלקות בהן יש רקבונות, וגם עליה בשכיחות האשכולות הנגועים בכל חלקה.

- הטיפול המיטבי להפחתת רקבונות – אוורור והסרה ידנית של אשכולות/חלקי אשכולות רקובים. טיפול זה מתאים בעיקר לחלקות איכות קטנות.

- במידה ונרצה לטפל על ידי ריסוס, כדאי לשלב חומרים כנגד "סוכני ההפצה" של נבגי הרקבונות – זבוב התסיסה ו/או חיפושית התסיסה.

- טיפולי האיבוק למינהם שנעשים על ידי מאבקות, יכולים להשתלב בתכנית העבודה לאחר ריסוס, ואינם מוגבלים בימים לפני הבציר. האיבוק הוא 'ירוק' (ידידותי לסביבה) ומביא לפחיתה בכמות הזבובים ולבסוף לייבוש אשכולות רקובים.



סיכום שבועי- כשותית

- כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, הכשותית שנראית בימים אלו בכרמים היא תוצר של העליה בלחות היחסית בחודש האחרון.
- ישנה עליה בממצאי כשותית באזורי הגליל והרי יהודה
- הטיפול כנגד הכשותית מומלץ בחלקות בהן הבציר עוד רחוק



סיכום שבועי- כללי

- חלקות ראשונות נבצרו בימים אלו (בעיקר זנים לבנים)
- בחלקות שנבצרו - כדאי להמשיך לתת תשומת לב לבריאות העלווה ולנוכחות קמחיות ולטפל במידת הצורך (ללא מגבלות ימים לבציר).