



דו"ח ניטור ארצי

כרמי יין 18/08 – 14/08/22

כשותית- נגיעות בעלים

● גליל עליון

84 חלקות, 1431 דונם
שלב פנולוגי : בוחל מלא – תחילת בציר.
ב 9% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה
ב 28% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

● מזרח השרון


37 חלקות, 877 דונם
שלב פנולוגי: הבשלה – תחילת בציר.
ב 57% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה
ב 30% מהחלקות נמצא נגיעות בינונית

● שפלת יהודה

132 חלקות, 6225 דונם
שלב פנולוגי: הבשלה – תחילת בציר.
ב 12% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה
ב 5% מהחלקות נמצא נגיעות בינונית

● חבל יתיר

47 חלקות, 444 דונם
שלב פנולוגי : תחילת בציר.
ב 4% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה



● רמת גולן

100 חלקות, 1565 דונם
שלב פנולוגי :
תחילת בוחל מלא – תחילת בציר.
ב 5% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

● הרי יהודה

61 חלקות, 1288 דונם
שלב פנולוגי : בוחל מלא – תחילת בציר.
ב 47% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה
ב 2% מהחלקות נמצא נגיעות בינונית

עש האשכול- ניטור ביצים וזחלים.

● גליל עליון

כל החלקות מבולבלות (86 חלקות)

לא נמצאו ביצים
לא נמצאו זחלים

● מזרח השרון

כל החלקות מבולבלות (25 חלקות)

לא נמצאו ביצים
לא נמצאו זחלים

● שפלת יהודה

חלקות מבולבלות (78 חלקות)

ב 24% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.8 ביצים לחלקה.
ב 5% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.0 זחלים לחלקה.

חלקות לא מבולבלות (44 חלקות)

ב 7% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.8 ביצים לחלקה.
לא נמצאו זחלים

● חבל יתיר

הכל לא מבולבל (47 חלקות)

לא נמצאו ביצים וזחלים

● רמת גולן

חלקות מבולבלות (44 חלקות)

לא נמצאו ביצים

ב 3% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.0 זחלים לחלקה.

חלקות לא מבולבלות (50 חלקות)

ב 2% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.0 ביצים לחלקה.
לא נמצאו זחלים

● הרי יהודה

כל החלקות לא מבולבלות


(61 חלקות)

ב 10% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.8 ביצים לחלקה.


ב 7% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.3 זחלים לחלקה.




עש האשכול- לכידת בוגרים במלכודות.




עש האשכול- לכידת בוגרים במלכודות אל מול ניטור ביצים בשפלת יהודה בחלקות לא מבולבלות.



רקבונות - שכיחות



רקבונות – שכיחות רקבונות מקסימלית באשכולות (סמוך לבציר) השוואה רב שנתית



* שכיחות רקבונות באשכולות של השבוע בלבד (צפוי לעלות ככל שהבציר מתקדם)

רקבונות – שכיחות לפי זן

מספר חלקות עם רקבון פעיל השבוע	שכיחות רקבונות	זן
12	29.1	פרנץ'
12	10.6	ארגמן
7	10.4	סוביניון בלאן
8	7.8	טמפרניו
7	6.3	גראנש
36	6.2	קריניאן
12	4.6	גורץ
10	3.7	שיראז
7	3.7	מלבק
10	2.4	קברנה סוביניון
7	1.9	שרדונה

התקדמות בציר – אחוז חלקות בצורות



סיכום שבועי- עש האשכול

- אנו מצויים ככל הנראה בפתחם של הטלות הביצים של הדור הרביעי של עש האשכול.
- מבחינת ממצאי ביצים בארץ, ישנו רצף שהחל בתחילת יולי ועד היום, בו כמעט תמיד היו דיווחי ביצים באזורים מסויימים.
- ישנה עליה בלכידות בוגרים בשבועיים האחרונים, והיא אינה מסונכרנת עם הטלות הביצים בחלקות (כמו בדורות הקודמים).
- תוקף בלבול זכרים – עבור מי שתלה את הבלבול בחלקות מוקדם יחסית, קיים סיכוי שהנידוף פסק, ועל כן צריך להתייחס לחלקה כלא מבולבלת ולטפל בהתאם.

סיכום שבועי- רקבונות

- מוצגת ההשוואה הרב שנתית בין העונות הקודמות, למצב הנוכחי העונה.
- כבר אפשר לומר כי ישנם יותר אשכולות עם רקבון השנה לעומת שנים קודמות.
- הזנים אשר נפגעו יותר – פרנץ' קולומבר, סוביניון בלאן וארגמן. לשניים הראשונים רגישות גבוהה לרקבונות (פיזיולוגית). נוסף על כך ישנה פגיעה משמעותית בחלקות אלו של עש האשכול.
- נזכיר כי הטיפול הנכון ישלב טיפול בפטריית הרקבון וגם בזבוב התסיסה ו/או חיפושית התסיסה.
- טיפול טוב, הוא טיפול שלאחריו נראה תהליך התייבשות של האשכולות, ללא התפשטות לאשכולות נוספים.



סיכום שבועי- כללי

- הבציר מתקדם לאיטו לאחר בציר החלקות המקדימות.
- עומס יבול גבוה מביא לקצב הבשלה נמוך, וכדאי לקחת זאת בחשבון כאשר קובעים תכנית טיפולים בחלקה שמתחשבת במספר הימים המותר בכל תכשיר