

דצמבר 2010

דף הנחיות לקראת הזמירה בכרמי היין עונת 2011

הקדמה

לפעולת הזמירה בכרם היין שתי מטרות עיקריות: ויסות פוריות הכרם ושמירה על מבנה הגפן - מבנה מאוורר ומואר המותאם לביצוע הפעולות הנדרשות במהלך העונה: לפעולות ממוכנות כמו ריסוסים, קיטומים ובציר; ולפעולות ידניות כמו דילול שריגים ודילול אשכולות.

מועד תחילת הזמירה

חשוב לזכור שמועד הזמירה הוא אחד הגורמים המשפיעים על המועד והאחידות של התעוררות הגפן, לצד גורמים נוספים כמו מזג האוויר השורר בחורף בעת הזמירה ולפניה; ומזג האוויר השורר באביב לאחר הזמירה, לקראת ההתעוררות. זנים שונים עשויים להגיב בצורה שונה למועד הזמירה ולתנאי מזג האוויר.

באופן כללי, ככל שיידחה מועד הזמירה - ההתעוררות והתפתחות הגפן בעונה הבאה תהיינה אחידות יותר. ההמלצה הכללית היא לא להתחיל בזמירה לפני חודש פברואר; אך לעתים המציאות מכתיבה לכורם להתחיל לזמור קודם, עם זאת, הקדמה בזמירה צריכה להיות שקולה ומחושבת.

כדי להגיע להחלטה בעניין מועד תחילת הזמירה על הכורם:

- א. לחשב כמה ימים דרושים לזמירת הכרם - דבר זה תלוי במספר הפועלים העומדים לרשותו ובהספקי הזמירה על סמך ניסיונו; לכך יש להוסיף את מספר הימים שבהם לא ניתן יהיה לעבוד בשל תנאי מזג האוויר (ימי גשם, שלג, רוחות עזות).
- ב. להניח על פי ניסיונו מתי תחול ההתעוררות הטבעית של כל חלקה, דבר התלוי במיקום הכרם ובזן הענבים.
- ג. מועד תחילת הזמירה יהיה התאריך שיתקבל מהפחתת ימי העבודה שחושבו לפי סעיף א' ממועד ההתעוררות של החלקות המאוחרות ביותר כמצוין בסעיף ב'.

סדר הזמירה

בשלב הבא יש להחליט על סדר הזמירה של החלקות השונות, ובפרט על החלקות שייזמרו מוקדם וייתכן שהתעוררותן תיפגע. השיקולים בנושא סדר הזמירה כלהלן:
א. כרם צעיר מנטיעת 2010 שייזמר לשתי עיניים, ובשנה הקרובה יעוצבו הגזע והזרועות שלו - בכרם כזה ישנה חשיבות פחותה לאחידות ההתעוררות ולכן אם יש צורך - ניתן לזמור אותו מוקדם יותר מהכרם הבוגר.

- ב. בכרמים שהזרועות שלהם עוצבו בקיץ האחרון יש חשיבות עליונה להתעוררות אחידה לאורך הבדים. כרמים אלו ייזמרו לקראת סוף פברואר ולאחר מכן מומלץ לרסס בתכשיר אלזודף לשיפור ההתעוררות. הריסוס יבוצע עד תחילת חודש מרס, בריכוז 4% עם משטח טריטון 100X בריכוז 0.025%. הריסוס יהיה עד נגר.
- ג. בזנים הנוטים להניב יבול גבוה מהרצוי (סנגיוביזה, ויונייה, מורבדריי) נהוג לדלל את יבולם. בזנים אלה הנזק שייגרם מהתעוררות לא אחידה בעקבות זמירה מוקדמת פחות משמעותי מהנזק העלול להיגרם בזנים הנוטים להניב יבול נמוך. בכל מקרה חלק מהפרי ידולל ולכן במהלך העונה ניתן לסלק את האשכולות הנישאים על שריגים חריגים ללא פגיעה ביבול הרצוי.
- ד. ישנם זנים שבהם ההתעוררות קשה יותר ובאופן טבעי מתעוררות בהם פחות עיניים; הזן מרלו הוא דוגמה ברורה לזן כזה. ישנם זנים שהתעוררותם הטבעית אינה מצטיינת באחידות כמו פטי ורדו - זנים כאלה מומלץ לזמור מפברואר.
- ה. מועד ההתעוררות הטבעית של הזן - זנים שהתעוררותם מוקדמת, יש לקחת בחשבון שזמירתם תסתיים לפני מועד התעוררותם. זנים שהתעוררותם מאוחרת כגון קברנה סובניון, פטי ורדו, מוסקט אלכסנדרוני - זמירתם יכולה להימשך עד סוף חודש מרס.
- ו. מומלץ שחלקות שהתעוררותן הייתה בלתי אחידה בשנה שעברה כתוצאה מזמירה מוקדמת - ייזמרו השנה מאוחר יחסית. התעוררות לקויה החוזרת במשך כמה שנים תגרום לליקויים במבנה, באיזון וביבול הגפן.

הנחיות נוספות

- א. אין לזמור כשהאדמה יבשה! חשוב שמערכת השורשים תהיה באדמה לחה לעומק של חצי מטר לפחות, כלומר לאחר יותר מחמישים מ"מ גשם או השקיה.
- ב. לזמירה מקדימה גבוהה (פרה-זמירה) שאחריה תבוצע זמירה מלאה אין משמעות מבחינת ההשפעה על ההתעוררות וניתן לעשותה הרבה לפני הזמירה הסופית, אולם רצוי לא לפני סוף ינואר. רק בחלקות הנזמרות מוקדם תיעשה פרה-זמירה מוקדם יותר.
- ג. זמירה מקדימה נעשית נמוך בגובה החתך הסופי במטרה לחסוך זמן עבודה בזמירה עצמה. חשוב שמשך הזמן בין הזמירה המקדימה לזמירה הסופית יהיה קצר ככל האפשר, אחרת הסעיפים השונים עלולים להתעורר במועדים שונים בהתאם למועד שבו נחתכו.
- ד. בחלקות שנזמרו מוקדם מאוד ומתחילה התעוררות לקויה במהלך פברואר יש לשקול ריסוס באלזודף במטרה לשרוף לבלובים אלו ולעודד התעוררות אחידה בזמן הרצוי.

במרכת צונה מולצחת ומרובת עמ"מ.

תרצה זהבי, ערן הרכבי ואייל רבן

מדרכי כרם יין, שה"מ