



אוקטובר 2024

נזק "חדש" בכרמים

נכתב ע"י תרצה זהבי, רפרנטית להגה"צ בגפן שה"מ

בשנים האחרונות אנו עדים לנזקים בכמה גידולים, שלא הכרנו בעבר, המיוחסים לנוכחות של תריפסים. בגפן נראים הנזקים "החדשים" על איברים צעירים, כלומר בצימוח הצעיר ובחנטים. מהידוע עד כה, במרבית אזורי הארץ עולה רמת האוכלוסייה של מיני תריפסים בסביבות חודש יולי, כאשר אין במרבית הכרמים צימוח צעיר נמרץ, ואילו בתקופת האביב, בסמוך לשלב הלבוב "הטבעי" והחנטה, לא נצפתה אוכלוסיית תריפסים חריגה ולא נראו הנזקים שהם מסבים לגידול. עם זאת, בלטו נזקים שלא הכרנו בעבר בכרמים צעירים, שנמצאו בשלב העיצוב ובהם הצימוח נמשך כל הקיץ, ובכרמים מחופים, המלבלבים אחרי זמירת הקיץ, כלומר בחודשים אפריל-יוני. בשני מקרים אלה הנזק התבטא בעצירה ובעיוות של התפתחות השריגים, דבר הפוגע בהמשך צימוח תקין.



תמונה 1: נזקים ועיכוב בצימוח צעיר



תמונה 2: גירודים בפרי שהתפתח לאחר זמירת קיץ



תמונה 3: נזק בכנה, לעומת הזן שנראה תקין

מעניין לציין כי נראה הבדל בולט במידת הנזק בין הזנים השונים, כשהנזק חמור במיוחד בכנות (חשוב כשנוטעים כנות להרכבה בשטח) ובחלק מהזנים החדשים (יין ומאכל) שחלקם תוצרי הכלאות עם מינים אמריקאים או אסייתיים.

הדברה. מה ידוע עד כה?

- א. האם ומתי לטפל?
- ב. ניטור התריפסים
- ג. ייעשה באמצעות חיפוש בעלים הצעירים ביותר.
- הדברה.
- בניסויים, שנערכו בעבר בגפנים, נראתה השפעה טובה על הצימוח לאחר ריסוס בספרטה בריכוז 0.08% או בטרייסר בשילוב טימור C. סביר שגם לתכשירים המורשים לשימוש נגד תריפסים אחרים תהיה השפעה ממתנת על האוכלוסייה ועל הנזק.

האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי. על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד. אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב של החתומים.

© שה"מ הוצאה לאור, 2024; עריכה לשונית: עדי סלוניקו; גרפיקה: לובה קמנצקי